

Matematyczne metody fizyki 3

Zestaw 3

3.1. Cząstka o masie m porusza się pod wpływem siły $F = F_0\theta(t)$ zgodnie z równaniem Newtona w ośrodku schrakteryzowanym przez siłę tarcia, która jest proporcjonalna do prędkości. Zakładając jednopunktowe warunki brzegowe w postaci: $x(0) = 0$ i $x'(0) = 0$, proszę wyznaczyć trajektorię cząstki w przestrzeni fazowej (położenie – pęd), rozwiązując równania Newtona techniką transformat całkowych.

3.2. Proszę wyznaczyć transformatę Wignera

$$\rho_W(x, k) = \int dX f^* \left(x - \frac{1}{2}X \right) f \left(x + \frac{1}{2}X \right) e^{-ikX}$$

z funkcji

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{2\pi\Delta x^2}} \exp \left[-\frac{1}{4\Delta x^2} (x - \langle x \rangle)^2 + i\langle k \rangle \left(x - \frac{1}{2}\langle x \rangle \right) \right].$$

3.3. Proszę obliczyć transformatę Fouriera z funkcji

$$f(\mathbf{r}) = \frac{1}{r^2 + \lambda^2},$$

gdzie $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ i $\lambda^2 > 0$.

3.4. Proszę przeprowadzić analizę Fouriera dla (1 + 1)-wymiarowego równania dyfuzji

$$\frac{\partial n(x, t)}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n(x, t)}{\partial x^2}$$

Wskazówka: W dowolnej chwili t gęstość cząstek $n(x, t)$ można wyrazić przez

$$n(k, t) = \int dx n(x, t) e^{-ikx}.$$

3.5. Proszę przeprowadzić analizę Fouriera dla równania Gaussa,

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = 0,$$

opisującego pole elektromagnetyczne w próżni.

Wskazówka: W dowolnej chwili t natężenie pola elektrycznego $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ można wyrazić przez

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3k \mathcal{E}(\mathbf{k}, t) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}.$$