

# Mechanika kwantowa

## Zestaw 6

6.1. Niech hamiltonian układu zapisany w obrazie Heisenberga ma postać

$$\hat{\mathbf{H}}_H(t) = \frac{\hat{\mathbf{p}}_H^2(t)}{2m} + U(\hat{\mathbf{x}}_H(t)).$$

Proszę wykazać, że  $\hat{\mathbf{H}}_H(t) = \hat{\mathbf{H}}_S$ .

6.2. Niech  $\hat{\mathbf{A}}_S$  oraz  $\hat{\mathbf{B}}_S$  są operatorami zapisanymi w obrazie Schrödingera i niech spełniają one relację komutacji w postaci

$$[\hat{\mathbf{A}}_S, \hat{\mathbf{B}}_S] = \alpha \hat{\mathbf{1}}.$$

gdzie  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Proszę obliczyć komutator

$$[\hat{\mathbf{A}}_H(t), \hat{\mathbf{B}}_H(t)],$$

gdzie  $\hat{\mathbf{A}}_H(t)$  oraz  $\hat{\mathbf{B}}_H(t)$  są tymi samymi operatorami co wyżej, ale zapisanymi w obrazie Heisenberga.

6.3 Proszę znaleźć rozwiązanie równań ruchu w obrazie Heisenberga dla hamiltonianu:

a) cząstki swobodnej,

b) cząstki w polu sił stałych takich, że energia potencjalna tej cząstki ma postać  $U(x) = -Fx$ .

Jako warunki początkowe należy przyjąć  $\hat{\mathbf{x}}_H(t=0) = \hat{\mathbf{x}}_H(0)$  oraz  $\hat{\mathbf{p}}_H(t=0) = \hat{\mathbf{p}}_H(0)$ .

6.4. Proszę obliczyć komutatory

$$[\hat{\mathbf{x}}_H(t), \hat{\mathbf{x}}_H(t')], \quad [\hat{\mathbf{x}}_H(t), \hat{\mathbf{p}}_H(t')], \quad [\hat{\mathbf{p}}_H(t), \hat{\mathbf{p}}_H(t')],$$

dla przypadków: a), b) z zadania 6.3.

6.5. Niech hamiltonian układu ma postać

$$\hat{\mathbf{H}}(t) = \hat{\mathbf{H}}_0 + \hat{\mathbf{W}}(t),$$

gdzie  $\hat{\mathbf{W}}(t)$  reprezentuje poprawkę do hamiltonianu  $\hat{\mathbf{H}}_0$  spowodowaną zaburzeniem zależnym od czasu. W obrazie oddziaływania<sup>1</sup> stan układu jest określony wzorem

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\mathbf{H}}_0 t} |\psi_S(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{\mathbf{H}}_0 t} e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{\mathbf{H}}(t)t} |\psi_S(0)\rangle := \hat{\mathbf{U}}_0^\dagger(t) \hat{\mathbf{U}}(t) |\psi_S(0)\rangle,$$

Proszę znaleźć równanie ruchu dla stanu  $|\psi_I(t)\rangle$  w obrazie oddziaływania. Z kolei operator  $\hat{\mathbf{A}}$  w obrazie oddziaływania ma postać

$$\hat{\mathbf{A}}_I(t) = \hat{\mathbf{U}}_0^\dagger(t) \hat{\mathbf{A}} \hat{\mathbf{U}}_0(t).$$

Proszę wykazać, że równanie ruchu dla tego operatora ma postać

$$i\hbar \frac{d}{dt} \hat{\mathbf{A}}_I(t) = \left[ \hat{\mathbf{A}}_I(t), \hat{\mathbf{H}}_0 \right].$$

**B. Spisak**

---

<sup>1</sup>Inaczej Tomanagi-Schwingera, a jeszcze inni używają określenia obraz Diraca.